Ilmanlaatu Rauma Hallikatu 2025



Rauma

Sisällys

1. Ilmanlaadun mittaus Raumalla 7
1.1. Mitattavat komponentit 7
1.2. Palvelusopimus 7
1.3. Mittausjärjestelmä ja laadunvarmistus 7
1.4. Palvelusopimus 8
1.5. Rauman keskustan ilmanlaadun tulevaisuuden näkymät 8
2. Lainsäädäntö 8
2.1. EU:n ilmanlaatudirektiivi (EU 2024/2881) 8
2.2. Ilmanlaatuasetus (Vna 79/2017) 9
2.2.1. Raja-arvot 9
2.2.2. Kriittiset arvot 9
2.2.3. Varoituskynnykset 10
2.3. Valtioneuvoston päätös ilmanlaadun ohjearvoista (Vn 480/1996) 10
2.4. WHO:n ohjearvot 11
2.5. Ilmansuojelusuunnitelma ja uusi etenemissuunnitelma 11
3. Hallikadun mittaustulokset 11
3.1. Ilmanlaatuindeksi 11
3.2. Hengitettävät hiukkaset 14
3.2.1. Tuntipitoisuudet 15
3.2.2. Vuorokausipitoisuudet 15
3.2.3. Kuukauden toiseksi suurin vuorokausiarvo 16
3.2.4. Kuukausittaiset keskiarvopitoisuudet 17
3.2.5. Vuosikeskiarvo 17
3.3. Pienhiukkaset 18
3.3.1. Tuntipitoisuudet 18
3.3.2. Vuorokausipitoisuudet 19
3.3.3. Kuukausittaiset keskiarvopitoisuudet 20
3.3.4. Vuosikeskiarvo 20
3.4. Typpidioksidi, NO_2 21
3.4.1. Tuntipitoisuudet 22
3.4.2. Kuukauden tuntiarvojen 99. prosenttipiste 23

3.4.3. Vuorokausipitoisuudet 23
3.4.4. Kuukauden toiseksi suurin vuorokausiarvo 24
3.4.5. Vuosikeskiarvo 25
3.5. Typen oksidit, NO_x 25
4. Väestön tiedottaminen ja varoittaminen 26

Liitteet

1. Ilmanlaadun raja- ja ohjearvoihin verrattavat pitoisuudet sekä raja- ja ohjearvot
2. Varoitus- ja tiedotuskynnysarvot
3. Mittausasemakortti

Raportin tuottaja: Rauman kaupunki, Tekninen toimiala, Ympäristönsuojelu
Laatija: Emmi Koskela
Julkaistu: 2026

Sanasto

Altistuminen	Ihmisen altistuminen epäpuhtaudelle, kun ihminen ja epäpuhtaus ovat samassa tilassa. Altistuksen määrään vaikuttavat epäpuhtauden pitoisuus ja kyseisessä tilassa vietetty aika.
Ilmansaasteet	Ilmansaasteet ovat haitallisia hiukkasmaisia tai kaasumaisia aineita, jotka ovat peräisin luonnosta tai seurausta ihmisen toiminnasta. Hiukkasmaiset ilmansaasteet aiheuttavat eniten vakavia terveyshaittoja.
Ilmanlaatuindeksi	Indeksi on tunneittain mittausasemalle laskettava vertailuluku, joka kuvaa sen hetkistä ilmanlaatua suhteutettuna ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin. Ilmanlaatuindeksi perustuu pitoisuuksien tuntiarvoihin ja se päivittyy tunnin välein.
NO_X	Typen oksidit (NO+NO2, NO_2:ksi laskettuna). Typen oksideja syntyy pääasiassa palamisessa, ja ne aiheuttavat happamoitumista, rehevöitymistä, korroosiota ja terveydellisiä ongelmia sekä osallistuvat alailmakehän otsonin muodostumiseen.
NO_2	Typpidioksidi. Kaasumainen yhdiste. Hengitysteitä ärsyttävä. Merkittävä ilmansaaste. Aiheuttaa luonnossa rehevöitymistä ja happamoitumista. Yleisimmät päästölähteet Suomessa ovat energiantuotanto, teollisuus ja liikenne.
NO	Typpimonoksidi, ilmassa nopeasti typpidioksidiksi hapettuva kaasu.
Ohjearvo	Ilmanlaadun mittaustuloksia verrataan ohje- ja raja-arvoihin. Kansalliset ohjearvot ovat pääosin terveysperusteisia ja ne on tarkoitettu ensisijaisesti ohjeeksi viranomaisille. Maailman Terveysjärjestö (WHO) on luokitellut ilman pilaantumisen suurimmaksi terveyteen kohdistuvaksi ympäristöriskiksi.
$PM_{2.5}$	Pienhiukkaset, jotka ovat halkaisijaltaan alle 2,5 mikrometriä (µm). Kulkeutuvat hengitysilman mukana syvemmälle hengitystiehyihin. Ovat peräisin lähinnä liikenteen pakokaasuista, puun pienpoltosta sekä katupölystä. Myös kaukokulkeumat nostavat pitoisuuksia (mm. metsäpalot).
PM_{10}	Hengitettävät hiukkaset, jotka ovat halkaisijaltaan alle 10 mikrometriä (µm). Kulkeutuvat hengitysteihin. Peräisin esimerkiksi katupölystä tai puun pienpoltosta.
Pitoisuus	Epäpuhtauden määrä tietyssä määrässä ilmaa, esitetään tässä raportissa yleensä mikrogrammaa epäpuhtautta kuutiometrissä ilmaa ($\mu g/m^3$).
Raja-arvo	Raja-arvot ovat sitovampia kuin ohjearvot ja ne perustuvat EU:n direktiiveihin. Ilmansuojeluviranomaisten on pyrittävä estämään niiden ylittyminen käytettävissä olevin keinoin.

Tavoitearvo	Tavoitearvolla tarkoitetaan ilman epäpuhtauden pitoisuutta, joka on mahdollisuuksien mukaan alitettava määräajassa, ja jolla pyritään vähentämään haitallisia terveys- ja ympäristövaikutuksia.
Varoituskynnys	Varoituskynnys on pitoisuustaso, jonka ylittyessä lyhytaikainenkin altistuminen vaarantaa väestön terveyden. Varoituskynnykset on annettu otsonille, rikkidioksidille ja typpidioksidille. Suomessa näin korkeat pitoisuudet ovat erittäin harvinaisia.
WHO:n ohjearvo	Maailman terveysjärjestö (WHO) luokittelee ilman pilaantumisen suurimmaksi terveyteen kohdistuvaksi ympäristöriskiksi. WHO antaa ilmansaasteille suositusohjearvot.
µg/m^3	Mikrogrammaa kuutiometrissä. Massatilavuuden yksikkö, joka kuvaa esimerkiksi ilmanlaadunmittauksissa kuinka monta mikrogrammaa epäpuhtautta on ilmassa.

Lisätietoja:

https://www.ilmatieteenlaitos.fi/ilmansaasteet

https://www.ilmatieteenlaitos.fi/saadokset-ja-ohjeet

Tiivistelmä

Valtioneuvoston asetuksessa ilmanlaadusta (79/2017) mukaan kunnalla on velvollisuus seurata ilmanlaatua ja turvata hyvä ilmanlaatu käytössä olevin keinoin. Raumalla ilmanlaatua seurataan jatkuvatoimisin mittauksin Rauman keskustassa Hallikadulla sijaitsevalla mittausasemalla. Typen oksideja (NO_x) on mitattu Hallikadulla vuodesta 2002 ja hengitettäviä hiukkasia (PM_{10}) vuodesta 2003 lähtien. Pienhiukkasten ($PM_{2,5}$) mittaus on aloitettu toukokuussa 2024.

Ilmanlaadun arviointia ja seurantaa ohjaavat Euroopan unionin ilmanlaatusäädökset sekä niiden kansallinen toimeenpano Suomessa. Lainsäädäntö on parhaillaan uudistumassa uuden EU:n ilmanlaatudirektiivin myötä, ja direktiivin kansalliset toimeenpanosäädökset ovat Suomessa valmistelussa. Uudet, nykyistä tiukemmat ilmanlaadun raja-arvot tulevat pääosin sovellettaviksi vuodesta 2030 alkaen.

Tässä raportissa Hallikadun vuoden 2025 mittaustuloksia on verrattu myös uusiin raja-arvoihin. Vuoden 2025 aikana ei ylitetty nykyisiä kansallisia eikä tulevia uuden ilmanlaatudirektiivin mukaisia raja-arvoja. Hengitettävien hiukkasten (PM_{10}) osalta mitattiin yksittäinen vuorokausiraja-arvopitoisuuden ylitys, mutta yksittäinen ylitys pysyi alle sallittujen ylityspäivien, joten varsinaiset raja-arvot eivät ylittynyt. Pienhiukkasten ($PM_{2,5}$) osalta vastaavia yksittäisiä ylityspäiviä mitattiin 2 kpl, joka myös jäi sallittujen ylitysmäärien alapuolelle.

Ilmanlaadulle on annettu myös kansallisia sekä maailman terveysjärjestön (WHO) antamia ohjearvoja. Vuoden 2025 mittausten aikana ei ylitetty kansallisia ohjearvoja kertaakaan. Sen sijaan sekä typpidioksidin että pienhiukkasten osalta WHO:n vuorokausiohjearvo ylitettiin Hallikadulla vuoden 2025 aikana useammin kuin WHO:n suositus (3 ylityskertaa vuodessa). Hengitettävien hiukkasten osalta vuonna 2025 Hallikadulla mitattiin vain yksittäinen ylityspäivä, mutta varsinaista raja-arvo ylitystä ei mitattu.

Ilmanlaatuindeksillä kuvattu ilmanlaatu oli Hallikadulla vuonna 2025 enimmäkseen hyvä, 88 % koko vuoden tuntijakaumasta. Heikoimmat ilmanlaatuindeksit mitattiin maaliskuun katupölyaikana ja heinäkuussa kaukokulkeuman ja keskuspuistotyömaan louhinnan seurauksena. Myös vuoden viimeisen päivän ja viimeisten tuntien ilotulitusten vaikutukset näkyivät ilmanlaatua heikentävästi.

Kooste Hallikadun mittausten vuoden 2025 ilmanlaatuun vaikuttavista tekijöistä:

- Helmikuussa poikkeuksellisen korkeat kaukokulkeumat Itä- ja Keski-Euroopasta - > pienhiukkaspitoisuudet
- Maaliskuu katupölyt
- Heinäkuussa pitkät hellejaksot, myös kaukokulkeumaa
- Keskuspuiston (sijainti lähellä mittausasemaa, kadun toisella puolella) rakentaminen 3.6.–5.11. Etenkin louhintatyöt välillä 30.6 - 22.7.2025
- Vuoden viimeisen päivän ilotulitteet

Koostetaulukot vuoden 2025 raja- ja ohjearvoihin verrattavista mittaustuloksista on esitetty liitteessä 1. Liitteessä 2 on koottu varoitus- ja tiedotuskynnyksiin verrattavat mittaustulokset.

1. Ilmanlaadun mittaus Raumalla

Ilmanlaatua seurataan jatkuvatoimisin mittauksin Rauman keskustassa Hallikadulla Nuortentalon pihapiirissä sijaitsevalla mittausasemalla. Mittausasema on vilkkaasti liikennöidyn kadun varrella, joten tulokset antavat tyypillisen kuvan keskustan alueen päästöistä sekä liikenteen että asumisen päästöjen suhteen. Mittausasemakortti on esitetty liitteessä 3.

Mittaukset perustuvat ympäristönsuojelulaissa (527/2014, 143 §) ja ilmanlaatuasetuksessa (Vna 79/2017, 3§) kunnalle määrättyyn velvollisuuteen huolehtia paikallisten olojen edellyttämästä ilmanlaadun seurannasta. Velvollisuus ei sellaisenaan edellytä kunnan omia jatkuvatoimisia mittauksia kaikille ilman epäpuhtauksille, vaan seurattavat epäpuhtaudet, seurannan laajuus ja käytettävät menetelmät määräytyvät ilmanlaatulainsäädännön vaatimusten, pitoisuustasojen, paikallisten päästölähteiden ja alueellisen seurantatarpeiden perusteella.



Kuva 1 Viistokuva pohjoisesta 3.6.2025. Mittausaseman sijainti merkitty punaisella pisteellä.

1.1. Mitattavat komponentit

Hallikadun mittausasemalla on kaksi jatkuvatoimista mittauslaitetta, joista toinen mittaa typen oksidien ja toinen hengitettävien ja pienhiukkasten pitoisuuksia (liite 3). Tulokset toimitetaan tunneittain Porin keskustietokoneen kautta Ilmatieteenlaitoksen ylläpitämään ilmanlaatuportaaliin. Typen oksideja (NO_x) on mitattu Hallikadulla vuodesta 2002 ja hengitettäviä hiukkasia (PM_{10}) vuodesta 2003 lähtien. Pienhiukkasten ($PM_{2,5}$) mittaus on aloitettu toukokuussa 2024.

1.2. Palvelusopimus

Rauman kaupunki toimii palvelusopimuksen mukaan ilmanlaadun tarkkailussa yhteistyössä Porin kaupungin elinvoima- ja ympäristötoimialan kanssa. Mittausaseman kalibroinnista ja tulosten editoinnista vastaa Aeri Oy. Hallikadun mittausaseman ylläpidosta ja mittaustulosten vuosiraportoinnista vastaa Rauman kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö.

1.3. Mittausjärjestelmä ja laadunvarmistus

Mittausohjelmistona käytetään Envidas Ultimate-ohjelmaa. Liitteen 3 mittausasemakortissa on kuvaukset käytettävistä laitteista. Porin ja Rauman virtuaalipalvelimella mittaustulosten keräämiseen, käsittelyyn ja lähettämiseen käytetään Envista ARM-ohjelmaa. Jatkuvatoimisen mittauksen tulokset lähtevät tunneittain

mobiiliyhteydellä Porin kaupungin elinvoima- ja ympäristötoimialan keskustietokoneelle, josta ne lähetetään edelleen Ilmatieteenlaitoksen ilmanlaatusivustolle, josta voi seurata ilmanlaatua tunnin viiveellä.

Automatisoidun mittausjärjestelmän tulokset tarkistetaan päivittäin ja tarvittavat korjaukset voidaan tehdä kalibrointien tai editointien yhteydessä. Mittalaitteiden huolloista, kalibroinneista ja mittaustulosten editoinneista vastaa Aeri Oy.

Raumalla on käytössä mittauksille sama laatujärjestelmä Harjavallan ja Porin mittausten kanssa. Laatujärjestelmä on laadittu standardia SFS-EN 17025:2017 soveltaen ja se koostuu muun muassa laatukäsikirjasta, erilaisista ohjeista sekä mittalaitteiden ja mittausasemien päiväkirjoista. Kenttämittausten laadunvarmistukset tehdään standardin SFS-EN 17025:2017 vaatimusten mukaisesti, kuitenkin niin, että monipistekalibrointi tehdään kolmen (3) kuukauden välein ja toistettavuustesti vähintään kerran vuodessa.

Raja-arvojen noudattamisen arviointiin käytettävän vuoden 2025 mittausaineiston kattavuus ylitti kaikkien mitattujen yhdisteiden osalta sille asetetun 90 prosentin laatutavoitteen.

1.4. Palvelusopimus

Rauman kaupunki toimii palvelusopimuksen mukaan ilmanlaadun tarkkailussa yhteistyössä Porin kaupungin elinvoima- ja ympäristötoimialan kanssa. Mittausaseman kalibroinnista ja tulosten editoinnista vastaa Aeri Oy. Hallikadun mittausaseman ylläpidosta ja mittaustulosten vuosiraportoinnista vastaa Rauman kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö.

1.5. Rauman keskustan ilmanlaadun tulevaisuuden näkymät

Tällä hetkellä Hallikadulla ei ole tarvetta laajentaa mitattavia parametreja. Typpidioksidin mittalaite on uusittu vuonna 2023 ja hiukkasten mittalaite vuonna 2024. Analysaattoreiden käyttöikä on noin 10 vuotta.

2. Lainsäädäntö

Ilmanlaadulle on olemassa useita laatuvaatimuksia ja -suosituksia. Suomen kansallinen ilmanlaatulainsäädäntö on yhteneväinen Euroopan unionin sääntelyn kanssa. Maailman terveysjärjestö WHO on antanut maailmanlaajuiset ohjearvot.

Tässä raportissa tarkastellaan vain Hallikadulla mitattaville yhdisteille (typpidioksidi, typen oksidit, hengitettävät hiukkaset (PM_{10}) ja pienhiukkaset ($PM_{2,5}$)) annettuja raja- ja ohjearvoja.

2.1. EU:n ilmanlaatudirektiivi (EU 2024/2881)

Euroopan unionin uusi ilmanlaatudirektiivi (EU) 2024/2881 hyväksyttiin joulukuussa 2024. Se velvoittaa jäsenmaat parantamaan ilmanlaatua vuoteen 2030 mennessä ja päivittämään raja-arvot vastaamaan maailman terveysjärjestön (WHO) vuoden 2021 suuntaviivoja. Lisäksi se edellyttää mm. varhaisia toimia ja ilmanlaadun etenemissuunnitelmia, jos riski normien ylittymisestä on olemassa. Direktiivin kansallinen täytäntöönpano on käynnissä Suomessa, ja päättyy 10.12.2026. Kunnille uuden direktiivin täytäntöönpano merkitsee mm. lisääntyviä tiedottamis-, raportointi-, mittaus- ja suunnitteluvelvoitteita sekä laajempaa yhteistyötä alueellisten ja kansallisten toimijoiden kanssa. Direktiivin myötä ilmanlaadun raja-arvot tulevat tiukentumaan 1.1.2030 alkaen. Tämän lisäksi direktiivi velvoittaa seuraamaan ilmanlaatua ennakoivasti jo vuosina 2026–2029 suhteessa vuoden 2030 raja-arvoihin.

2.2. Ilmanlaatuasetus (Vna 79/2017)

2.2.1. Raja-arvot

Valtioneuvoston asetuksessa ilmanlaadusta (Vna 79/2017) on annettu raja-arvot muun muassa typpidioksidille, hengitettäville hiukkasille ja pienhiukkasille. Raja-arvoilla tarkoitetaan ilman epäpuhtauksien korkeinta sallittua pitoisuutta. Niiden ylittyessä on ryhdyttävä toimiin pitoisuuksien alentamiseksi. Lyhytaikaisille raja-arvoille (tunti ja vuorokausipitoisuudet) on annettu sallittujen ylitysten lukumäärä vuodessa. Jokaisesta tunti- ja vuorokausiraja-arvopitoisuuden ylityksestä on tiedotettava väestöä.

Taulukko 1 Nykyiset raja-arvot ja sallittujen ylitysten määrä vuodessa (Vna 79/2017).

		Nykyiset raja-arvot Vna 79/2017				
		Raja-arvo vuosi	Raja-arvo vrk	Ylitysten määrä vuodessa	Raja-arvo tunti	Ylitysten määrä vuodessa
Typpidioksidi NO_2	µg/m³	40	-	-	200	18
Hengitettävät hiukkaset PM_{10}	µg/m³	40	50	35	-	-
Pienhiukkaset $PM_{2,5}$	µg/m³	25	-	-	-	-

Taulukko 2 Uudet raja-arvot ja sallittujen ylitysten määrät (EU 2024/2881).

		EU:n ilmanlaatudirektiivin raja-arvot 2030 lähtien (EU 2024/2881)				
		Raja-arvo vuosi	Raja-arvo vrk	Ylitysten määrä vuodessa	Raja-arvo tunti	Ylitysten määrä vuodessa
Typpidioksidi NO_2	µg/m³	20	50	18	200	3
Hengitettävät hiukkaset PM_{10}	µg/m³	20	45	18	-	-
Pienhiukkaset $PM_{2,5}$	µg/m³	10	25	18	-	-

2.2.2. Kriittiset arvot

Kasvillisuuden ja ekosysteemien suojelemiseksi on annettu kriittiset tasot typenoksideille sekä rikkidioksidille. Niitä sovelletaan metsä- ja maatalousalueilla eli niin sanotuilla tausta-alueilla. Suomessa tausta-alueet jäävät näiden arvojen alle.

Taulukko 3 Typenoksidien kriittinen taso vuodessa (Vna 79/2017).

		Kriittinen taso vuosi
Typen oksidit NO+NO_2	µg/m³	30

2.2.3. Varoituskynnykset

Kynnysarvot määrittelevät tason, jonka ylittyessä on tiedotettava tai varoitettava kohonneista ilmansaasteiden pitoisuuksista. Varoituskynnys on pitoisuustaso, jonka ylittyessä lyhytaikainenkin ilmansaasteille altistuminen vaarantaa terveyden. Suomessa ei kuitenkaan ole näin korkeita pitoisuustasoja. Nykyisin varoituskynnys on asetettu typenoksidin lisäksi otsonille ja rikkidioksidille. Uudessa ilmanlaatudirektiivissa on annettu typenoksidin osalta tiukempi varoituskynnys. Lisäksi kynnysarvot on annettu hengitettäville hiukkasille ja pienhiukkasille.

Taulukko 4 Typpidioksidin varoituskynnys (Vna 79/2017).

		Varoituskynnys	**Aika**
Typpidioksidi NO_2	µg/m³	400	kolme peräkkäistä tuntia

Taulukko 5 Uudet varoitus- ja tiedotuskynnykset vuodesta 2030 lähtien (EU 2024/2881).

		Varoitus-kynnys	**Aika**	**Tiedotus-kynnys**	**Keskiarvoitus-aika**
Typpidioksidi NO_2	µg/m³	200	3 peräkkäistä tuntia	150	1 h
Hengitettävät hiukkaset PM_{10}	µg/m³	90	3 peräkkäistä vrk	90	1 vrk
Pienhiukkaset $PM_{2,5}$	µg/m³	50	3 peräkkäistä vrk	50	1 vrk

2.3. Valtioneuvoston päätös ilmanlaadun ohjearvoista (Vn 480/1996)

Valtioneuvoston päätös ilmanlaadun ohjearvoista (480/1996) määrittelee terveyshaittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi ilman epäpuhtauksille ohjearvot, jotka otetaan huomioon muun muassa maankäytön ja rakentamisen suunnittelussa. Tavoitteena on ehkäistä ohjearvojen ylittyminen.

Taulukko 6 Typpidioksidin ja hengitettävien hiukkasten ohjearvot (480/1996).

		kk:n 2. suurin vrk-arvo	**kk:n tuntiarvojen 99. prosenttipiste**
Typpidioksidi NO_2	µg/m³	70	150
Hengitettävät hiukkaset PM_{10}	µg/m³	70	-

2.4. WHO:n ohjearvot

Maailman terveysjärjestö WHO on myös antanut terveysperusteisia ohjearvoja ilmansaasteiden pitoisuuksille. WHO päivitti syksyllä 2021 ilmansaasteiden ohjearvopitoisuudet, joita pienemmillä pitoisuuksilla haitallisia terveysvaikutuksia ei esiinny lainkaan tai ne ovat vain vähäisiä. WHO:n antamat ohjearvot ovat suositusluontoisia ja ne perustuvat terveyshaittoihin, joita ilmansaasteiden on todettu aiheuttavan. Ohjearvoilla pyritään vaikuttamaan ilmanlaadun kehitykseen asettamalla tavoitteita sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. WHO:n vuorokausiohjearvoissa sallitaan kolme ylityskertaa vuodessa.

Taulukko 7 WHO:n ohjearvot (vuoden 2021 päivitys).

		Vuosi	Vrk	Ylitysten määrä vuodessa	Tunti
Typpidioksidi NO_2	µg/m³	10	25	3	200
Hengitettävät hiukkaset PM_{10}	µg/m³	15	45	3	-
Pienhiukkaset $PM_{2,5}$	µg/m³	5	15	3	-

2.5. Ilmansuojelusuunnitelma ja uusi etenemissuunnitelma

Jos ilman epäpuhtauksille säädetty raja-arvo ylittyy tai on vaarassa ylittyä, kunnan on laadittava keskipitkän tai pitkän aikavälin ilmansuojelusuunnitelma raja-arvon alittamiseksi ja raja-arvon ylityksen keston lyhentämiseksi ympäristönsuojelulain (527/2014) 141 § mukaan. Ilmansuojelusuunnitelmaa ei tarvitse laatia, jos kyse on hengitettäville hiukkasille (PM_{10}) säädettyjen raja-arvojen ylityksestä, joka johtuu talvikunnossapitoon liittyvästä katujen hiekoituksesta tai suolauksesta aiheutuvan hiukkaskuormituksen vuoksi. Raumalla minkään mitatun epäpuhtauden raja-arvo ei ole ylittynyt.

Jos vuosina 2026–2029 mittauksissa havaitaan uusien raja-arvojen ylityksiä, kunnan on laadittava ilmansuojelun etenemissuunnitelma uuden ilmanlaatudirektiivin mukaisesti. Etenemissuunnitelma tulee laatia mahdollisimman pian, viimeistään kahden vuoden aikana siitä kalenterivuodesta jona ylittyminen on kirjattu.

3. Hallikadun mittaustulokset

3.1. Ilmanlaatuindeksi

Ilmanlaatuindeksiä käytetään päivittäisessä ilmanlaatutiedotuksessa. Sen avulla tiedottamista voidaan tiivistää havainnolliseen väriasteikkoon ja laatusanoihin hyvä, tyydyttävä, välttävä, huono tai erittäin huono. Indeksi perustuu pitoisuuksien tuntiarvoihin ja se kuvaa sen hetkistä ilmanlaatua suhteutettuna ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntijoiden arvioihin pitoisuuksien yhteydestä terveysriskeihin. Hallikadun mittausasemalla ilmanlaatuindeksi lasketaan tunneittain typpioksidin, hengitettävien hiukkasten ja pienhiukkasten tuntiarvoista. Eri mittausasemien indeksit eivät välttämättä ole keskenään täysin vertailukelpoisia sillä ilmanlaadunindeksin laskennassa voidaan käyttää eri yhdisteitä (rikkidioksidin (SO_2), typpidioksidin (NO_2), hengitettävien hiukkasten (PM_{10}), pienhiukkasten ($PM_{2,5}$), otsonin (O_3) ja haisevien rikkiyhdisteiden (TRS) pitoisuuksia). Jokaisella epäpuhtaudella on oma kerroinlukunsa, jota käytetään indeksin laskemiseen.

EU:n uuden ilmanlaatudirektiivin myötä ilmanlaatuindeksi tulee muuttumaan kuusi luokkaiseksi. EEA (Euroopan ympäristökeskus) julkaisi uuden indeksin vuonna 2025. Suomessa uusi indeksi luokitus on vielä kesken.

Taulukko 8 Ali-indeksin määrittelyyn käytettävät indeksiarvot (µg/m³).

Indeksiluokka	NO_2	PM_{10}	$PM_{2,5}$
Hyvä	<40	<20	<10
Tyydyttävä	40-70	20-50	10-25
Välttävä	70-150	50-100	25-50
Huono	150-200	100-200	50-75
Erittäin huono	>200	>200	>75

Taulukko 9 Eri indeksiluokkien mahdolliset terveys- ja muut vaikutukset.

Indeksiluokka	Terveysvaikutukset	Muut vaikutukset
Hyvä	Ei todettuja	Lieviä luontovaikutuksia pitkällä aikavälillä
Tyydyttävä	Hyvin epätodennäköisiä	Lieviä kasvillisuus- ja materiaalivaikutuksia pitkällä aikavälillä
Välttävä	Epätodennäköisiä	Selviä kasvillisuus- ja materiaalivaikutuksia pitkällä aikavälillä
Huono	Mahdollisia herkillä yksilöillä	Selviä kasvillisuus- ja materiaalivaikutuksia pitkällä aikavälillä
Erittäin huono	Mahdollisia herkillä väestöryhmillä	Selviä kasvillisuus- ja materiaalivaikutuksia pitkällä aikavälillä



Kuvaaja 1 Ilmanlaatuindeksin prosentuaalinen jakauma kuukausittain vuonna 2025.

Hallikadun mittausasemalla ilmanlaadun indeksi oli vuonna 2025 pääosin hyvää. Vain yksittäiset arvot yltivät luokkaan huono tai erittäin huono. Huonointa ilmanlaatu oli indeksin mukaan maaliskuussa, jolloin se oli hyvää 61 %, tyydyttävää 32 %, välttävää 5 %, huonoa < 1 % ja erittäin huono <1 % ajasta. Parhain ilmanlaatu Hallikadulla oli vuonna 2025 indeksin mukaisesti toukokuussa, jolloin ilmanlaatuindeksi oli 99 % ajasta hyvää.

Vuonna 2025 ilmanlaatua heikensi pääasiassa helmi- ja heinäkuussa pienhiukkasten kaukokulkeumat, maaliskuussa katupölyt, talvikaudella puun pienpoltto sekä vuoden viimeisen päivän ilotulitteet. Lisäksi heinäkuun Hallikadun ilmanlaatuun vaikutti mittausaseman vieressä, kadun toisella puolella, sijaitsevan Keskuspuiston työmaa. Keskuspuiston työmaa kesti 3.6.- 5.11.2025, mutta aikavälillä 30.6.–22.7. työmaalla suoritettiin louhintaa.



Kuvaaja 2 Koko vuoden 2025 ilmanlaadun tuntijakauma (%) ilmanlaatuindeksinä.

3.2. Hengitettävät hiukkaset

Hengitettävien hiukkasten (PM_{10}) vuorokausikeskiarvon raja-arvopitoisuus 50 µg/m^3 ylittyi vuonna 2025 yhden kerran. Sallittujen ylityspäivien määrä on 35 päivää vuodessa, joten varsinainen raja-arvo ei ylittynyt.

EU:n ilmanlaatudirektiivin tuleva vuorokausiraja-arvo on 45 µg/m^3. Tämä ylittyi vuonna 2025 yhden kerran. Ylityspäiviä tullaan sallimaan 13 päivää vuodessa, joten tulevaa varsinaista raja-arvoa ei ylitetty.

Taulukko 10 Hallikadun vuoden 2025 PM_{10}-mittaustulosten vertailu ilmanlaadun raja-arvoihin.

Hengitettävät hiukkaset PM_{10}	**Aika**	**Raja-arvo µg/m^3**	**Sallitut ylitykset vuodessa (kpl)**	**Ylitykset v. 2025 Hallikadulla (kpl)**
Nykyiset raja-arvot (Vna 79/2017)	vuorokausi	50	35	1 (14.3.2025)
	vuosi	40	-	-
Raja-arvot vuodesta 2030 lähtien (EU 2024/2881)	vuorokausi	45	18	1 (14.3.2025)
	vuosi	20	-	0

WHO:n asettama hengitettävien hiukkasten (PM_{10}) vuorokausiohjearvopitoisuus 45 µg/m^3 ylittyi vuonna 2025 yhden kerran. Ohjearvoon sallitaan kolme ylityspäivää vuodessa.

Valtioneuvoston päätös ilmanlaadun ohjearvoista 480/1996, § 2 mukaan hengitettävien hiukkasten kuukauden toiseksi suurin vuorokausiarvo ei tulisi olla korkeampi kuin 70 µg/m^3. Hengitettävien hiukkasten vuorokausiohjearvo 70 µg/m^3 ei ylittynyt Hallikadun mittauksissa vuonna 2025 kertaakaan.

Taulukko 11 Hallikadun vuoden 2025 PM_{10}-mittaustulosten vertailu ilmanlaadun ohjearvoihin.

Hengitettävät hiukkaset PM_{10}	**Aika**	**Ohje-arvo µg/m^3**	**Sallitut ylitykset vuodessa (kpl)**	**Ylitykset v. 2025 Hallikadulla (kpl)**
WHO	vuorokausi	45	3	1 (14.3.2025)
	vuosi	15	-	-
Valtioneuvoston päätös ohjearvoista (VN 480/1996)	Kuukauden toiseksi suurin vuorokausiarvo	70	-	-

3.2.1. Tuntipitoisuudet

Vuoden 2025 korkeimmat PM_{10}-pitoisuudet mitattiin maaliskuussa (14.3.2025), jolloin tuntipitoisuus ylitti kertaalleen 250 µg/m³ ja oli yli kuusi tuntia peräkkäin yli 100 µg/m³. Yli 100 µg/m³ tuntipitoisuuksia mitattiin tämän lisäksi myös maaliskuun loppupuolella, joulukuussa sekä kertaalleen helmi-, heinä- ja lokakuussa. Yhteensä 15 tuntina vuoden 2025 aikana.
Maaliskuun puolen välin hiukkaspitoisuuksia nosti tuulinen ja kuiva pakkassää, jonka seurauksena katupölyt nousivat ilmaan.
Jääpuiston rakentaminen Keskuspuistoon heinäkuusta vuoden loppuun asti heikensi puiston ympäristössä ilmanlaatua ajoittain vuoden jälkimmäisellä puoliskolla (louhintaa 30.6-22.7).



Kuvaaja 3 Vuoden 2025 hengitettävien hiukkasten tuntipitoisuudet Hallikadulla.

3.2.2. Vuorokausipitoisuudet

Vuoden 2025 aikana hengitettävien hiukkasten vuorokausiarvo ylitti 50 µg/m³ raja-arvopitoisuuden yhden kerran. Ylitys (70,1 µg/m³) tapahtui 14.3.2025. Lähellä uutta ilmanlaatudirektiivin raja-arvoa (45 µg/m³) käytiin maaliskuun lisäksi myös pariin otteeseen joulukuussa.

Uuden ilmanlaatudirektiivin mukaista kynnysarvoa (90 µg/m³) ei ylitetty.



Kuvaaja 4 Vuoden 2025 hengitettävien hiukkasten vuorokausipitoisuudet Hallikadulla.

3.2.3. Kuukauden toiseksi suurin vuorokausiarvo

Joulukuussa mitattiin vuoden korkein toiseksi suurin vuorokausiarvo (44,2 µg/m³), seuraavaksi korkein toiseksi suurin vuorokausiarvo (43,2 µg/m³) mitattiin maaliskuussa. Valtioneuvoston asettama ohjearvo 70 µg/m³ ei siis ylittynyt vuoden 2025 aikana, sillä pitoisuudet jäivät tämän alla.



Kuvaaja 5 Vuoden 2025 kuukauden toiseksi suurimmat vuorokausipitoisuudet.

3.2.4. Kuukausittaiset keskiarvopitoisuudet

Kuukausikohtaisesti korkein keskiarvopitoisuus oli maaliskuussa (20,5 µg/m³) ja toiseksi suurin heinäkuussa (14,7 µg/m³). Koko vuoden mittausten keskiarvo oli 9,6 µg/m³.



Kuvaaja 6 Vuoden 2025 hengitettävien hiukkasten keskiarvot kuukausittain sekä punaisella koko vuoden keskiarvopitoisuus.

3.2.5. Vuosikeskiarvo

Vuoden 2025 PM_{10} kalenterivuoden keskiarvo oli 9,6 µg/m³. Tämä on alle valtioneuvoston asetuksen mukaisen vuosiraja-arvon (40 µg/m³) sekä EU:n ilmanlaatudirektiivin tulevan vuosiraja-arvon (20 µg/m³) ja WHO ohjearvon (15 µg/m³). Vuoden 2025 keskiarvopitoisuus oli hieman edellisvuosia 2023–2024 alhaisempi.



Kuvaaja 7 Vuoden 2025 keskiarvopitoisuus verrattuna aiempiin vuosiin ja vuosiraja- ja ohjearvoihin.

3.3. Pienhiukkaset

Pienhiukkasten ($PM_{2,5}$) mittaus on aloitettu Rauman Hallikadun mittausasemalla 22.5.2024, joten vuosi 2025 oli ensimmäinen, kun mittaustuloksia saatiin koko vuodelta. Pienhiukkasten kansallinen vuosiraja-arvopitoisuus on 25 µg/m^3 ja EU:n ilmanlaatudirektiivin tuleva vuosiraja-arvo 10 µg/m^3. Molemmat raja-arvot alittuivat Hallikadulla vuonna 2025.

Pienhiukkasille ei ole nykyisin voimassa olevaa vuorokausi raja-arvoa, mutta EU:n ilmanlaatudirektiivin tuleva vuorokausiraja-arvo on 25 µg/m^3. Tämä ylittyi vuonna 2025 kaksi kertaa. Ylityspäiviä tullaan sallimaan 18 päivää vuodessa, joten tulevaa varsinaista raja-arvoa ei ylitetty. WHO:n pienhiukkasten vuorokausipitoisuuksien ohjearvo sitä vastoin ylittyi Hallikadulla 7 kertaa kun sallittu ylitysmäärien lukumäärä on vain 3 kpl.

Taulukko 12 Hallikadun vuoden 2025 $PM_{2,5}$-mittaustulosten vertailu ilmanlaadun raja-arvoihin.

Pienhiukkaset $PM_{2,5}$	**Aika**	**Raja-arvo µg/m^3**	**Sallitut ylitykset vuodessa (kpl)**	**Ylitykset v. 2025 Hallikadulla (kpl)**
Nykyiset raja-arvot (Vna 79/2017)	vuorok ausi	-	-	-
	vuosi	25	-	0
Raja-arvot vuodesta 2030 lähtien (EU 2024/2881)	vuorokausi	25	18	2 (23.2 ja 31.12)
	vuosi	10	-	0

Taulukko 13 Hallikadun vuoden 2025 $PM_{2,5}$-mittaustulosten vertailu ilmanlaadun ohjearvoihin.

Pienhiukkaset $PM_{2,5}$	**Aika**	**Ohje-arvo µg/m^3**	**Sallitut ylitykset vuodessa (kpl)**	**Ylitykset v. 2025 Hallikadulla (kpl)**
WHO	vuorokausi	15	3	7 22.2.2025 23.2.2025 29.3.2025 14.7.2025 15.7.2025 23.7.2025 31.12.2025
	vuosi	5	-	0

3.3.1. Tuntipitoisuudet

Vuoden 2025 korkeimmat $PM_{2,5}$-tuntipitoisuudet mitattiin joulukuun viimeisenä päivänä, jolloin tuntipitoisuudet ylittivät neljä kertaa yli 50 µg/m³. Vuoden korkein tuntipitoisuus oli 64, 8 µg/m³ (31.12.2025). Myös maaliskuussa mitattiin kaksi kertaa yli 50 µg/m³ oleva tuntipitoisuus (14.3.2025).

Vuoden viimeisen päivän osalta korkeat pitoisuudet painottuvat vuoden viimeisiin tunteihin, jotka viittaavat ilotulitteiden aiheuttamiin päästöihin.



Kuvaaja 8 Vuoden 2025 pienhiukkasten tuntipitoisuudet Hallikadulla.

3.3.2. Vuorokausipitoisuudet

Vuoden 2025 aikana pienhiukkasten vuorokausiarvo ylitti vuonna 2030 voimaan astuvan 25 µg/m³ raja-arvopitoisuuden kaksi kertaa. Ylitykset tapahtuivat 23.2.2025 (29,6 µg/m³) ja 31.12.2025 (28,5 µg/m³). WHO:n vuorokausiohjearvo (15 µg/m³) ylittyi näiden lisäksi helmi-, maalis- ja heinäkuussa. Yhteensä ylityksiä oli 7 kpl ja WHO:n suositus on 3 ylitystä vuodessa.

Helmikuun lopussa pienhiukkaspitoisuudet olivat poikkeuksellisen korkeita monin paikoin koko Suomessa Itä- ja Keski-Euroopasta saapuneen laaja-alaisen kaukokulkeuman vuoksi.

Uuden ilmanlaatudirektiivin mukaista kynnysarvoa (50 µg/m³) ei ylitetty.



Kuvaaja 9 Vuoden 2025 pienhiukkasten vuorokausipitoisuudet Hallikadulla.

3.3.3. Kuukausittaiset keskiarvopitoisuudet

Kuukausikohtaisesti korkein keskiarvopitoisuus oli heinäkuussa (8,2 µg/m³) ja toiseksi ja kolmanneksi suurimmat mitattiin helmikuussa (7,0 µg/m³) ja maalikuussa (6,7 µg/m³). Koko vuoden mittausten keskiarvo oli 4,7 µg/m³.

Heinäkuun pienhiukkaspitoisuuksia nosti kaukokulkeuma sekä Keskuspuiston louhintatyöt.



Kuvaaja 10 Vuoden 2025 pienhiukkasten keskiarvot kuukausittain sekä punaisella koko vuoden keskiarvopitoisuus.

3.3.4. Vuosikeskiarvo

Pienhiukkasten $PM_{2,5}$ vuosikeskiarvo oli 4,7 µg/m³. Hallikadun vuoden 2025 pienhiukkaspitoisuus jäi hieman alle WHO:n vuosiohjearvon (5 µg/m³) ja selvästi alle nykyisen raja-arvon (25 µg/m³) ja tulevan raja-arvon (10 µg/m³). Vuoden 2025 keskiarvopitoisuus oli hieman vuoden 2024 pitoisuutta matalampi.



Kuvaaja 11 Vuosien 2024 ja 2025 keskiarvopitoisuudet verrattuna vuosiraja- ja ohjearvoihin.

3.4. Typpidioksidi, NO_2

Typpidioksidin pitoisuudet pysyivät Hallikadulla vuonna 2025 selvästi alle nykyisen ja vuonna 2030 voimaan astuvien tunti- ja vuosiraja-arvojen. Lisäksi vuoden 1996 ilmanlaadun ohjearvot alittuivat selkeästi.

Myös WHO:n ohjearvoista tunti- ja vuosiraja-arvot alittuivat Hallikadulla vuonna 2025 mutta vuorokausiraja-arvo 25 µg/m³ ylittyi, sillä ylityksiä mitattiin 5 kertaa ja ylityksiä sallitaan kolme.

Taulukko 14 Hallikadun vuoden 2025 typpidioksimittausten vertailu ilmanlaadun raja-arvoihin.

Typpidioksidi NO_2	**Aika**	**Raja-arvo µg/m³**	**Sallitut ylitykset vuodessa (kpl)**	**Ylitykset v. 2025 Hallikadulla (kpl)**
Nykyiset raja-arvot (Vna 79/2017)	tunti	200	18	0
	vuosi	40	-	0
Raja-arvot vuodesta 2030 lähtien (EU 2024/2881)	tunti	200	3	0
	vuorokausi	50	18	0
	vuosi	20	-	0

Taulukko 15 Hallikadun vuoden 2025 typpidioksidimittaustulosten vertailu ilmanlaadun ohjearvoihin.

Typpidioksidi NO_2	**Aika**	**Ohje-arvo µg/m³**	**Sallitut ylitykset vuodessa (kpl)**	**Ylitykset v. 2025 Hallikadulla (kpl)**
WHO	tunti	200	-	0
	vuorokausi	25	3	**5** 12.1.2025 6.2.2025 10.2.2025 19.2.2025 31.12.2025
	vuosi	10	-	0
Valtioneuvoston päätös ohjearvoista (VN 480/1996)	Kuukauden tuntiarvojen 99. prosenttipiste	150	-	0
	Kuukauden toiseksi suurin vuorokausiarvo	70	-	0

3.4.1. Tuntipitoisuudet

Vuonna 2025 mitatut NO_2 tuntipitoisuudet olivat tyypillisiä eli lämmityskaudella pitoisuudet olivat korkeampia kuin kesäajalla. Korkein tuntipitoisuus mitattiin joulukuussa 94,8 µg/m³ ja seuraavaksi korkeimmat tuntipitoisuudet helmikuussa 94,6 ja 92,6 µg/m³. Näiden lisäksi yli 70 µg/m³ tuntipitoisuuksia mitattiin viitenä peräkkäisenä tuntina tammikuussa (12.1.2026) sekä yksittäisinä tunteina joulu- ja helmikuussa. Touko-lokakuun välisenä aikana typpidioksidin tuntipitoisuudet pysyivät kaikki alle 50 µg/m³ ja pääosin alle 40 µg/m³. Talvikuukausina korkeammat pitoisuusarvot selittyvät lisääntyneellä liikenteellä ja lämmityksellä. Vuoden 2025 korkeimmat tuntipitoisuudet (kuvaaja 12) osuvat pääosin kylmiin pakkasajankohtiin (kuvaaja 13).

Vuoden 2025 NO_2 tuntipitoisuudet eivät ylittäneet kertaakaan 200 µg/m³, joka on valtinoneuvoston raja-arvopitoisuus, sekä WHO:n ohjearvopitoisuus ja uuden ilmanlaatudirektiivin kynnysarvoa. Näin ollen vuonna 2025 ei ylitetty myöskään nykyistä varoituskynnystä (400 µg/m³).



Kuvaaja 12 Vuoden 2025 typpidioksidin tuntipitoisuudet Hallikadulla.



Kuvaaja 13 Vuoden 2025 keskilämpötilat Ilmatieteenlaitoksen Pyynpään mittausasemalla.

3.4.2. Kuukauden tuntiarvojen 99. prosenttipiste

Typpioksidin (NO_2) tuntiarvojen korkeimmat 99. prosenttipisteet 59 ja 58 µg/m³ mitattiin heti alkuvuonna. Valtioneuvoston asetuksen ohjearvo 150 µg/m³ ei ylittynyt vuoden 2025 aikana.



Kuvaaja 14 Vuoden 2025 typpidioksidin tuntipitoisuuksien 99. prosenttipisteet Hallikadulla.

3.4.3. Vuorokausipitoisuudet

NO_2 korkein vuorokausiarvo 42 µg/m³ mitattiin helmikuussa ja toiseksi korkein vuoden viimeisenä päivänä (40 µg/m³). WHO vuorokausiohjearvo on 25 µg/m³ ja sallii enintään kolme ylitystä vuodessa. Kyseinen ohjearvo ylittyi Hallikadulla viitenä päivänä vuoden aikana. WHO:n suosittelema vuorokausiohjearvo on tiukka ja ylityksiä tulee useissa Suomen kaupungeissa erityisesti talvikuukausina. Myös Hallikadun vuoden 2025 ylityspäivät olivat kaikki talviaikana (lämmityskausi ja liikenne).

EU:n uuden ilmanlaatudirektiivin tuleva vuorokausiraja-arvo on 50 µg/m³ ja ylityksiä sallitaan 18 kpl vuodessa. Hallikadulla ei mitattu yhtään ylitystä vuonna 2025.



Kuvaaja 15 Vuoden 2025 typpioksidin vuorokausipitoisuudet Hallikadulla.

3.4.4. Kuukauden toiseksi suurin vuorokausiarvo

NO_2 kuukauden toiseksi suurimmista vuorokausiarvoista suurin oli helmikuun pitoisuus 26,5 µg/m³, joten ohjearvo 70 µg/m³ ei ylittynyt.



Kuvaaja 16 Vuoden 2025 typpidioksidin toiseksi suurimmat vuorokausipitoisuudet kuukausittain Hallikadulla.

3.4.5. Vuosikeskiarvo

Vuonna 2025 NO_2 keskiarvopitoisuus oli 6,1 µg/m³, mikä on alle valtioneuvoston asetuksen raja-arvon 40 µg/m³ sekä EU:n uuden ilmanlaatudirektiivin tulevan vuosiraja-arvon 20 µg/m³ ja WHO asettaman ohjearvon 10 µg/m³. Vuoden 2025 vuosikeskiarvopitoisuus oli koko vertailukauden 2005–2025 alhaisin pitoisuus.



Kuvaaja 17 Vuoden 2025 keskiarvopitoisuus verrattuna aiempiin vuosiin ja vuosiraja- ja ohjearvoihin.

3.5. Typen oksidit, NO_x

Typen oksideille on asetettu Valtioneuvoston asetuksessa ilmanlaadusta (70/2027) kasvillisuuden suojelemiseksi kriittinen raja 30 µg/m³. Vuonna 2025 Hallikadun typenoksidien pitoisuus oli 9,2 µg/m³ ja se alitti säädetyn kriittisen rajan.



Kuvaaja 18 Typenoksidien vuosikeskiarvojen vertailu 2023–2025.

4. Väestön tiedottaminen ja varoittaminen

Ilmanlaatu voi heikentyä hetkellisesti muun muassa katupölyn, puun pienpolton, teollisuuslaitosten häiriötilanteiden tai pienhiukkasten kaukokulkeutumien takia. Rauman kaupungin ympäristönsuojeluyksikön tehtävä on tiedottaa väestöä ilman epäpuhtauksien aiheuttamasta vaarasta hengitettävien hiukkasten (PM_{10}), pienhiukkasten ($PM_{2,5}$) ja typpidioksidin raja-arvon ylittyessä tai lähestyessä. Kunnan tiedottamisvastuu perustuu valtioneuvoston asetukseen ilmanlaadusta (79/2017) sekä ympäristönsuojelulakiin (527/2014).

Ilmanlaadun heikkenemisestä kertovat tiedotteet ja varoitukset sisältävät tiedon epäpuhtauden laadusta ja pitoisuudesta, koska ylitys on tapahtunut, miten tilanteen ennustetaan muuttuvan, riskiryhmä ja mahdolliset terveysvaikutukset sekä tarvittaessa neuvoja niiden ehkäisemiseen.

Tiedote hengitettävien hiukkasten korkeista pölypitoisuuksista Hallikadulla julkaistiin 17.3.2025 kaupungin ajankohtaista tiedotteissa. Hengitettävien hiukkasten vuorokausiraja-arvo ylitettiin perjantaina 14.3, jolloin tuulinen, kuiva pakkassää nosti katupölyä ilmaan.

Lisäksi pienhiukkasten vuorokausipitoisuuksien noususta yli WHO:n ohjearvopitoisuuden tiedotettiin 16.7.2025. Tällöin kaukokulkeuma eli maan rajojen ulkopuolelta kulkeutuvat pienhiukkaset aiheuttivat ilmanlaadun heikkenemistä.

Jokaisesta vuoden 2025 ylityspäivästä tiedotettiin erikseen kaupungin verkkosivuilla.

Lähteet

Harjavallan, Porin ja Rauman ilmanlaadun mittausten laatujärjestelmän kuvaus. Porin kaupunki. Elinvoima- ja ympäristötoimiala. 5.11.2024

HSY. Ilmanlaadun sääntely. Osoitteessa: Ilmanlaadun sääntely - HSY. Viitattu 20.10.2026

HSY. Mikä on ilmanlaatuindeksi? Osoitteessa: https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/ilmansuojelu-ja-terveys/mika-on-ilmanlaatuindeksi/. Viitattu 28.9.2026.

Ilmanlaadun seuranta, Rauman kaupunki.

Ilmatieteen laitos. 2025. Ilmanlaatu on heikentynyt laajoilla alueilla Suomessa. Tiedote 25.2.2025.

Ilmatieteenlaitos: Havaintojen lataus-palvelu. Osoitteessa: Havaintojen lataus - Ilmatieteen laitos
Viitattu 2.11.2026.

Ilmatieteen laitos. Ilmanlaadun mittausohje 2025, Raportteja 2025:1. Helsinki 10.1.2025

Ilmatieteenlaitos. ilmanlaadun säädökset ja ohjeet. Osoitteessa: Säädökset ja ohjeet - Ilmatieteen laitos.
Viitattu 20.10.2026

Kyllönen, K., Suhonen, E., Korpi, K., Saarnio, K., Karppinen, A., Sundström, A.-M. & Hellén, H. 2026. *Uudistetun ilmanlaatudirektiivin 2881/2024 vaatimukset – vaikutusarvio kansallista täytäntöönpanoa varten*. Ilmatieteen laitos, Raportteja 2026:2. Saatavissa osoitteessa: Uudistetun ilmanlaatudirektiivin 2881/2024 vaatimukset – vaikutusarvio kansallista täytäntöönpanoa varten Viitattu 16.10.2026.

Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (26.1.2017/79) § 18 ja § 19. Saatavissa osoitteessa: Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta | 79/2017 | Lainsäädäntö | Finlex. Viitattu 4.11.2026

Valtioneuvoston päätös ilmanlaadun ohjearvoista ja rikkilaskeuman tavoitearvosta 480/1996. Saatavissa osoitteessa: *https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1996/19960480*.

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) § 143 ja § 144. Saatavissa osoitteessa: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527.

Ilmanlaadun raja- ja ohjearvoihin verrattavat pitoisuudet sekä raja- ja ohjearvot

Typpidioksidi NO_2		**Nykyiset raja-arvot Vna 79/2017**					**EU:n ilmanlaatudirektiivin raja-arvot 2030 lähtien (EU 2024/2881)**					**Ohjearvot (Vn päätös 480/1996)**		**WHO:n ohjearvot vuoden 2021 päivitys**			
		Raja-arvo vuosi	Raja-arvo vrk	Ylitysten määrä vuodessa	Raja-arvo tunti	Ylitysten määrä vuodessa	Raja-arvo vuosi	Raja-arvo vrk	Ylitysten määrä vuodessa	Raja-arvo tunti	Ylitysten määrä vuodessa	kk:n 2. suurin vrk-arvo	kk:n tuntiarvojen 99. prosenttipiste	Vuosi	Vrk	Ylitysten määrä vuodessa	Tunti
	Yksikkö	40	-	-	200	18	20	50	18	200	3	70	150	10	25	3	200
Hallikatu v. 2025	µg/m³	6,1	-	-	59 *	0	6,1	13*	0	78**	0	26,5	59	6,1	27**	5	95
Typen oksidit NO+NO2		**Nykyiset raja-arvot Vna 79/2017**					**EU:n ilmanlaatudirektiivin raja-arvot 2030 lähtien (EU 2024/2881)**					**Ohjearvot (Vn päätös 480/1996)**		**WHO:n ohjearvot vuoden 2021 päivitys**			
		Kriittinen taso vuosi	Raja-arvo vrk	Ylitysten määrä vuodessa	Raja-arvo tunti	Ylitysten määrä vuodessa	Raja-arvo vuosi	Raja-arvo vrk	Ylitysten määrä vuodessa	Raja-arvo tunti	Ylitysten määrä vuodessa	kk:n 2. suurin vrk-arvo	kk:n tuntiarvojen 99. prosenttipiste	Vuosi	Vrk	Ylitysten määrä vuodessa	Tunti
	Yksikkö	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hallikatu v. 2025	µg/m³	9,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hengitettävät hiukkaset PM_{10}		**Nykyiset raja-arvot Vna 79/2017**					**EU:n ilmanlaatudirektiivin raja-arvot 2030 lähtien (EU 2024/2881)**					**Ohjearvot (Vn päätös 480/1996)**		**WHO:n ohjearvot vuoden 2021 päivitys**			
		Raja-arvo vuosi	Raja-arvo vrk	Ylitysten määrä vuodessa	Raja-arvo tunti	Ylitysten määrä vuodessa	Raja-arvo vuosi	Raja-arvo vrk	Ylitysten määrä vuodessa	Raja-arvo tunti	Ylitysten määrä vuodessa	kk:n 2. suurin vrk-arvo	kk:n tuntiarvojen 99. prosenttipiste	Vuosi	Vrk	Ylitysten määrä vuodessa	Tunti
	Yksikkö	40	50	35	-	-	20	45	18	-	-	70		15	45	3	-
Hallikatu v. 2025	µg/m³	9,6	18***	1	-	-	9,6	35 *	1	-	-	44		12	43 **	1	-
Pienhiukkaset $PM_{2,5}$		**Nykyiset raja-arvot Vna 79/2017**					**EU:n ilmanlaatudirektiivin raja-arvot 2030 lähtien (EU 2024/2881)**					**Ohjearvot (Vn päätös 480/1996)**		**WHO:n ohjearvot vuoden 2021 päivitys**			
		Raja-arvo vuosi	Raja-arvo vrk	Ylitysten määrä vuodessa	Raja-arvo tunti	Ylitysten määrä vuodessa	Raja-arvo vuosi	Raja-arvo vrk	Ylitysten määrä vuodessa	Raja-arvo tunti	Ylitysten määrä vuodessa	kk:n 2. suurin vrk-arvo	kk:n tuntiarvojen 99. prosenttipiste	Vuosi	Vrk	Ylitysten määrä vuodessa	Tunti
	Yksikkö	25	-	-	-	-	10	25	18	-	-	-	-	5	15	3	-
Hallikatu v. 2025	µg/m³	4,7	-	-	-	-	4,7	12*	2	-	-	-	-	4,7	18**	7	-

Taulukossa "-" viittaa tilanteeseen, jossa kyseiselle aineelle ei ole annettu raja-arvoa.
* vuoden 19. korkein pitoisuus
** vuoden 4. korkein pitoisuus
*** vuoden 36. korkein pitoisuus

Varoitus- ja tiedotuskynnysarvot

Typpidioksidi NO_2		**Nykyiset kynnysarvot Vna 79/2017**		**EU:n ilmanlaatudirektiivin kynnysarvot 2030 lähtien (EU 2024/2881)**			
		Varoitus-kynnys	3 peräkkäistä tuntia	Varoitus-kynnys	3 peräkkäistä tuntia	Tiedotus-kynnys	Keskiarvoitusaika, 1h
	Yksikkö	400		200		150	
Hallikatu v. 2025	µg/m³	ei ylitetty korkein tuntipitoisuus 94,8		ei ylitetty korkein tuntipitoisuus 94,8		ei ylitetty korkein tuntipitoisuus 94,8	
Hengitettävät hiukkaset PM_{10}		**Nykyiset kynnysarvot Vna 79/2017**		**EU:n ilmanlaatudirektiivin raja-arvot 2030 lähtien (EU 2024/2881)**			
		-	-	Varoitus-kynnys	3 peräkkäistä vrk	Tiedotus-kynnys	Keskiarvoitusaika, 1 vrk
	Yksikkö	-		90		90	
Hallikatu v. 2025	µg/m³	-		ei ylitetty korkein vrkpitoisuus 70		ei ylitetty korkein vrkpitoisuus 70	
Pienhiukkaset $PM_{2,5}$		**Nykyiset kynnysarvot Vna 79/2017**		**EU:n ilmanlaatudirektiivin raja-arvot 2030 lähtien (EU 2024/2881)**			
		-	-	Varoitus-kynnys	3 peräkkäistä vrk	50	Keskiarvoitusaika, 1 vrk
	Yksikkö	-		50		50	
Hallikatu v. 2025	µg/m³	-		ei ylitetty korkein vrkpitoisuus 30		ei ylitetty korkein vrkpitoisuus 30	

RAUMA, HALLIKATU

Osoite:	Hallikatu
Mittausparametrit:	$PM_{2.5}$, PM_{10} ja NO_X
Laitteet (suluissa hankinta/käyttöönotto pvm):	hiukkasanalysaattori: Palas, Fidas 200: PM1, PM2,5, PM4, PM10, PMtot (22.5.2024)
	Envea AC32e kemiluminesenssiin perustuva
	NO-NO_2-NO_x-analysaattori (26.4.2023)
Näytteenottokorkeudet maanpinnasta:	NO_X: 3,5 m PM_{10}: 4 m
Ympäristö:	Kaupungin keskusta
Merkitykselliset päästölähteet:	Liikenne, asutus



